

烟草种质资源数据采集表

1 基本信息				
全国统一编号(1)		种质库编号(2)		
引种号(3)		采集号(4)		
种质名称(5)		种质外文名(6)		
科名(7)		属名(8)		
学名(9)		原产国(10)		
原产省(11)		原产地(12)		
海拔(13)		m	经度(14)	
纬度(15)		来源地(16)		
保存单位(17)		保存单位编号(18)		
系谱(19)		选育单位(20)		
育成年份(21)		育种方法(22)		
种质类型(23)	1: 野生资源 2: 地方品种 3: 选育品种 4: 品系 5: 遗传材料 6: 其他			
调制类型(24)	1: 白肋烟 2: 黄花烟 3: 烤烟 4: 晒晾烟 5: 香料烟 6: 雪茄烟			
图像(25)		观测地点(26)		
2 形态特征和生物学特性				
播种期(27)		成苗期(28)		
苗龄(29)		移栽期(30)		
现蕾期(31)		中心花开放期(32)		
移栽至现蕾天数(33)		天	移栽至中心花开放天数(34)	天
蒴果成熟期(35)		全生育期(36)		天
株型(37)	1: 橄榄型 2: 筒型 3: 塔型		株高(38)	cm
茎围(39)	cm		节距(40)	cm
叶数(41)	片		叶长(42)	cm

叶宽(43)	cm		叶柄(44)	m
叶形(45)	1: 宽椭圆 2: 椭圆 3: 长椭圆 4: 宽卵圆 5: 卵圆 6: 长卵圆 7: 心脏形 8: 披针形			
叶尖(46)	1: 钝尖 2: 渐尖 3: 急尖 4: 尾状	叶面(47)	1: 平 2: 较平 3: 较皱 4: 皱	
叶缘(48)	1: 平滑 2: 微波 3: 波浪 4: 皱折 5: 锯齿	叶色(49)	1: 浅绿 2: 黄绿 3: 绿 4: 深绿	
叶片厚度(50)	1: 薄 2: 较薄 3: 中等 4: 较厚 5: 厚			
叶耳(51)	0: 无 1: 小 2: 中 3: 大			
叶片主脉粗细(52)	1: 细 2: 中 3: 粗	主侧脉夹角(53)	1: 小 2: 中 3: 大	
茎叶角度(54)	1: 小 2: 中 3: 大 4: 甚大	花序密度(55)	1: 松散 2: 密集	
花序形状(56)	1: 球形 2: 扁球形 3: 倒圆锥形 4: 菱形	花色(57)	1: 白 2: 黄 3: 淡红 4: 红 5: 深红	
花冠尖(58)	0: 无 1: 有	花冠长度(59)	cm	
花冠直径(60)	cm		花萼长度(61)	cm
产量(62)	kg/hm ²		上等烟比率(63)	%
中等烟比率(64)	%	种子形状(65)	1: 卵圆形 2: 椭圆形 3: 肾形	
种子颜色(66)	1: 浅褐色 2: 褐色 3: 深褐色	千粒重(67)	g	
蒴果形状(68)	1: 圆形 2: 卵圆形 3: 长卵圆形			
3 品质特性				
原烟颜色(69)	1: 柠檬黄 2: 青黄 3: 桔黄 4: 微带青 5: 淡棕 6: 棕色 7: 红棕 8: 褐色	原烟色度(70)	1: 浓 2: 强 3: 中 4: 弱 5: 淡	
原烟结构(71)	1: 疏松 2: 尚疏松 3: 稍密 4: 紧密	原烟身份(72)	1: 薄 2: 稍薄 3: 中等 4: 稍厚 5: 厚	
原烟油分(73)	1: 少 2: 稍有 3: 有 4: 多	原烟单叶重(74)	g	
总糖(75)	%	还原糖(76)	%	
总氮(77)	%	蛋白质(78)	%	

总植物碱 (79)	%	焦油(80)	mg/ 支
烟气总植物碱 (81)	%	氧化钾 (82)	%
氯离子 (83)	%		
香气风格 (84)	1: 清 2: 清偏中 3: 中偏清 4: 中间香 5: 中偏浓 6: 浓偏中 7: 浓香 8: 特香型 9: 皮丝香型 (即莫合烟) 10: 雪茄香型 (雪茄烟) 11: 香料香型 (香料烟) 12: 白肋香型 (白肋烟) 13: 晒黄香型 (晒黄烟) 14: 似烤烟香型 (晒黄烟) 15: 调味香型 (晒黄烟) 16: 晒红香型 (晒红烟) 17: 调味香型 (晒红烟) 18: 亚雪茄香型 (晒红烟) 19: 半香料香型 (晒红烟) 20: 似白肋香型 (晒红烟) 21: 马里兰 (马里兰烟)		
香型程度 (85)	1: 显著 2: 较显著 3: 有 4: 微有 5: 缺乏		
劲头 (86)	1: 小 2: 较小 3: 适中 4: 较大 5: 大		
浓度 (87)	1: 浓 2: 较浓 3: 中等 4: 较淡 5: 淡		
香气质 (88)	1: 好 2: 较好 3: 中等 4: 较差		
香气量 (89)	1: 充足 2: 足 3: 较足 4: 尚足 5: 有 6: 较少		
余味 (90)	1: 舒适 2: 较舒适 3: 尚舒适 4: 欠适 5: 差		
杂气 (91)	1: 微有 2: 较轻 3: 有 4: 略重 5: 重		
刺激性 (92)	1: 轻 2: 微有 3: 有 4: 略大 5: 大		
燃烧性 (93)	1: 强 2: 较强 3: 中等 4: 较差 5: 熄火		
灰色 (94)	1: 白色 2: 灰白 3: 黑灰		
评吸得分 (95)			
质量档次 (96)	1: 好 2: 较好 3: 中等 4: 较差 5: 差		
4 抗逆性			
耐旱性(97)	3: 强 5: 中 7: 弱	耐涝性(98)	3: 强 5: 中 7: 弱
5 抗病虫性			
黑胫病抗性(99)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
青枯病抗性(100)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
根结线虫病抗性(101)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
赤星病抗性 (102)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
普通花叶病抗性(103)	0: 免疫 1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
黄瓜花叶病抗性(104)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
马铃薯 Y 病毒病抗性(105)	1: 高抗 3: 抗病 5: 中抗 7: 中感 9: 感病		
烟蚜抗性(106)	1: 高抗 3: 抗 5: 中抗 7: 感 9: 高感		

6 其他特征特性			
主茎枝数(107)	1: 单枝 2: 多枝		
生长习性(108)	1: 一年生草本 2: 一年生木本 3: 多年生草本 4: 多年生木本		
雌蕊长度(109)	1: 不外露 2: 外露	雌蕊长度(110)	1: 不外露 2: 外露
开花习性 (111)	1: 昼开 2: 夜开		
指纹图谱与分子标记 (112)			
备注(113)			

填表人:

审核:

日期: